Dorzecze Warty (z wyłączeniem dorzecza Liswarty)

Dorzecze Warty jest niejednorodne pod względem ichtiofauny. Na znacznej długości rzeki panują warunki niekorzystne dla fauny ryb – znaczna koncentracja zanieczyszczeń (pochodzących głównie z Częstochowy i Radomska oraz innych miejscowości nadwarciańskich) i liczne mocno przekształcone odcinki koryta (regulacja koryta). Najgorsza sytuacja panuje w górnym odcinku rzeki, już od jej źródeł. Wspomniane wyżej czynniki wpływają na bardzo ubogi skład ichtiofauny z dominującymi gatunkami typowymi dla wód zanieczyszczonych, zwłaszcza płocią, a także okoniem, ślizem i kiełbiem. Niekorzystny wpływ na ichtiofaunę dorzecza Warty ma również Zbiornik Poraj, odcinający górny bieg rzeki od reszty dorzecza.

Łącznie w dorzeczu Warty, zlokalizowanym w województwie śląskim, rodzimą ichtiofaunę tworzy 28 gatunków ryb i 2 gatunki minogów. Dodatkowo występuje tu 5 gatunków obcych dla polskiej ichtiofauny: karp, karaś srebrzysty, sumik karłowaty, muławka wschodnioamerykańska oraz pstrąg tęczowy. Brak danych o gatunkach ichtiofauny wymarłych w dorzeczu Pilicy w granicach województwa.

Dodana: 17 stycznia 2025 11:01 Zmodyfikowana: 29 stycznia 2025 14:11