Karpacka część województwa śląskiego

Niezależnie od wyznaczonych regionów ichtiogeograficznych na krótkie omówienie, ze względu na odrębny charakter, zasługuje ichtiofauna karpackiej części województwa. Lokalne zespoły ryb odznaczają się tutaj wyraźną strefowością. Najwyżej położone, niewielkie cieki zasiedlają: pstrąg potokowy i głowacz pręgopłetwy. W położeniach nieco niższych pojawiają się dodatkowo: brzanka, strzebla potokowa, śliz, lipień i minóg strumieniowy. Rzeki podgórskie odznaczają się mniejszym udziałem pstrąga, głowacz pręgopłetwy jest w nich zastępowany przez głowacza białopłetwego, spotykane są też inne gatunki, m.in.: brzana, świnka, jelec, kleń, piekielnica. Dalej wykształcają się już zespoły ryb typowe dla rzek nizinnych. W rzekach karpackiej części województwa występuje współcześnie 16 gatunków ryb i minogów. W granicach województwa część karpacka jest jedynym miejscem występowania brzanki i głowacza pręgopłetwego. Gatunkiem wymarłym w rzekach omawianej części województwa jest łosoś – gatunek, któremu zapory na rzekach uniemożliwiają odbywanie wędrówek.

Dodana: 17 stycznia 2025 11:06 Zmodyfikowana: 29 stycznia 2025 14:12